

SITUAÇÕES QUE NECESSITAM ISOLAMENTO NA URN

- Sífilis congénita nas primeiras 24h de terapêutica
- Oftalmia gonocócica
- Infecção congénita a herpes vírus
- Varicela congénita – deve estar em quarto de pressão negativa
- Rubéola congénita
- Infecção congénita a enterovírus
- Diarreia
- Lesões cutâneas supuradas

PROTECÇÃO DO PESSOAL DE SAÚDE

PRECAUÇÕES UNIVERSAIS

Para diminuir o risco de infecção ocupacional com microorganismos transmitidos pelo sangue o sangue e os fluídos biológicos de todos os doentes devem ser considerados potencialmente infectados.

NA SALA DE PARTOS

Dado o potencial desconhecimento de muitos agentes infecciosos, na assistência ao RN na sala de partos deve ser implementado o uso de luvas, bata/avental, óculos e máscara.

USO DE LUVAS

Devem ser usadas nas seguintes situações:

- Extracção de sangue
- Punção venosa
- Preenchimento do cartão de diagnóstico precoce
- Administração de medicamentos EV ou IM
- Cuidados com o cordão umbilical
- Colocação de sonda nasogástrica
- Aspiração de secreções
- Limpeza de vómito, urina ou fezes





• **ATITUDES PRÁTICAS**

- Se existe risco materno infeccioso conhecido tome as seguintes atitudes:
 - Durante o trabalho de parto evite a monitorização interna.
 - Dê banho ao RN com água corrente e sabão neutro imediatamente após o nascimento. Alguns autores consideram que esta deve ser uma medida universal.
 - Tome em atenção se deve desaconselhar o aleitamento materno, prescrever vacinas ou imunoglobulinas em especial ou fazer rastreio laboratorial.
 - Ponderar a relação risco/benefício do armazenamento de leite humano para administração a RN que não o da própria mãe.

Medidas de isolamento empíricas. Doente sem diagnóstico definitivo		
Condição	Agente / doença provável	Tipo de isolamento
Diarreia	Bacilos entéricos	Contacto
Meningite	N meningitidis	Gotículas
Exantema		
Petequial	N meningitidis	Gotículas
Vesicular	Varicela	Via aérea e contacto
Maculopapular com coriza e febre	Sarampo	Via aérea
Infecção respiratória		
Com cavitação pulmonar	Tuberculose	Via aérea
Com tosse paroxística em epidemia de tosse convulsa	Tosse convulsa	Gotículas
Bronquiolite, laringite	VSR, parainfluenza	Contacto e gotículas

Adaptado de REDBOOK
2003

